

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТИТОВ

H60 Наружный отит

Симптомы

- **Боль** в области слухового прохода. Усиливается при надавливании на козелок
- **Зуд** в области наружного слухового прохода
- Ощущения заложенности и шумов в ухе
- Снижение **слуха**
- Выделения из уха

Формы отита

H60.0 Абсцесс наружного уха
H60.3 Наружный отит диффузный. Ухо пловца

H65 Негнойный средний отит

Симптомы

- Ощущение заложенности в ухе и дискомфорта
- **Боль** в ухе
- Шум в ухе
- Ощущение «переливания» жидкости в ухе
- Гиперемия

Формы отита

H65.0 Острый серозный средний отит
H65.2 Хронический серозный средний отит

H66 Гнойный средний отит

Симптомы

- Снижение слуха
- Появление гнойных выделений из слухового прохода. **Перфорация** барабанной перепонки
- Шум в больном ухе

Формы отита

H66.0 Острый гнойный средний отит
H66.1 Хронический гнойный средний отит



Препараты компании SENTISS
для ежедневной практики
отоларинголога

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников



SENTISS

000 «Сентисс Рус»

115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д. 6, стр.16, этаж 4, офис 12
Тел.: +7 495 229-76-63, факс: +7 495 229-76-64 . E-mail: sentiss@sentiss.ru
Сайт: sentiss.ru

RU.ENT.2020.03.01

ДАНЦИЛ®

Офлоксацин 0,3%

Капли ушные
и глазные 5 мл



РУ ЛСР-009895
отпуск по рецепту

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО
ОТИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ,
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ С 1 ГОДА¹**

- Водный раствор обеспечивает хорошее проникновение в среднее ухо. Не окрашивает ткани и не маскирует клиническую картину
- Отсутствие ототоксичности^{1,2}

Показания¹:

- Наружный отит
- Хронический гнойный средний отит, в т.ч. с перфорацией барабанной перепонки
- Острый средний отит с установленной тимпаностомической трубкой

Способ применения¹:

Дети от 1 года до 11 лет	Дети с 12 лет и взрослые
5 капель	10 капель
3 раза в день	2 раза в день
10 дней	10-14 дней

КОМБИНИЛ®

Ципрофлоксацин 0,3% +
дексаметазон 0,1%

Капли глазные
и ушные 5 мл



РУ ЛСР-006467/09
отпуск по рецепту

Разрешен
детям
с 1 года

**ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ* ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО
И СРЕДНЕГО ОТИТА У ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ С 1 ГОДА¹**

- Высокая активность комбинации ципрофлоксацин + дексаметазон против возбудителей, включая синегнойную палочку (выше, чем у комбинации с неомицином)³
- Выраженное противовоспалительное действие, достоверное уменьшение боли и отека^{4,5}
- Отсутствие ототоксичности^{1,2}

Показания¹:

- Острый наружный отит
- Острый средний отит при шунте барабанной перепонки
- Острый средний отит с грануляциями и отореей при наличии шунта барабанной перепонки

Способ применения¹:

Взрослым и детям с 1 года

4 капли в каждое ухо, 2 раза в день, 7 дней

*В РФ по данным grls.rosminzdrav.ru

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Данцил® (https://grls.rosminzdrav.ru) *Изменения к инструкции КомбиниЛ® от 25.07.2019). 2. Местное применение фторхинолонов в фармакотерапии заболеваний наружного и среднего уха. С. Я. Косяков и соавт. Учеб. пособие, М., 2014.3. Dohar J.E., Roland P. et al. Differences in bacteriologic treatment failures in acute otitis externa between ciprofloxacin/dexamethasone and neomycin/polymyxin B/hydrocortisone: results of a combined analysis // Curr Med Res Opin. 2009; 25 (2): 287-91.4. Mosges R, Schroder T. Dexamethasone phosphate in antibiotic ear drops for the treatment of acute bacterial otitis externa. Curr Med Res Opin. 2008; 5. Храпов Н.С. и соавт. Опыт использования ушных капель КомбиниЛ при лечении наружного диффузного отита. Вести оториноларингологии, №6, 2013

ЦИПРОМЕД

Ципрофлоксацин 0,3%

Ушные капли 10 мл



РУ П/НФ012981/02
отпуск по рецепту

**ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ОТИТОВ С 15 ЛЕТ¹**

- Действует на всех основных возбудителей бактериальных отитов
- Высокая активность в отношении синегнойной палочки
- Вязкая консистенция и дегидратирующий эффект пропиленгликоля позволяют снизить риск присоединения грибковой инфекции

Показания¹:

- Воспаление наружного слухового прохода
- Острый и хронический средний отит
- Внутренний отит и инфекционные воспаления евстахиевой трубы
- Профилактика инфекционных отитов при травмах, до и после операций

Способ применения¹:

По 5 капель в каждое ухо 3 раза в день.
Длительность – по указанию врача

¹ Инструкция по медицинскому применению Данцил®. 2. Местное применение фторхинолонов в фармакотерапии заболеваний наружного и среднего уха. С.Я. Косяков и соавт. Учеб. пособие, М., 2014

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Ципромед