



ОБЪЕДИНЯТЬ ЛУЧШЕЕ — наша традиция

Р N00326/01 от 13.10.2016 г.



- Изокомб® объединяет **4 МНН** основного ряда¹.
- В состав включен витамин В₆¹.
- В **3 раза** снижает количество потребляемых таблеток в сутки².
- Разрешен к применению у детей с 13 лет¹.
- Применение комбинированных препаратов одобрено приказом МЗ РФ №951³.
- Российское производство^{1,4}.



Информация для медицинских и фармацевтических работников.

Перед назначением препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению.

¹ Инструкция по применению лекарственного препарата Изокомб®, утвержденная МЗ РФ

² Данные из инструкции к лекарственным препаратам соответствующих МНН, утвержденные МЗ РФ.

³ Приказ №951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».

⁴ Упаковка препарата и выпускающий контроль качества на территории РФ.

 **акрихин**
Люди заботятся о Людах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



Торговое наименование:
ИЗОКОМБ®

Регистрационный номер:

P N003363/01
от 13.10.2016 г.

МНН:

**Изониазид +
пирразинамид +
рифампицин +
этамбутол +
[Пиридоксин]**

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Противотуберкулезное комбинированное средство. Код АТХ: J04AM 06.

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Впервые диагностированные различные формы и локализации туберкулеза с наличием или отсутствием бактериовыделения (МБТ, чувствительные к основным противотуберкулезным препаратам).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Гиперчувствительность;
- Беременность, лактация;
- Детский возраст до 13 лет;
- Заболевания печени и желудочно-кишечного тракта в острой фазе;
- Заболевания центральной нервной системы (эпилепсия и другие заболевания со склонностью к судорожным припадкам);
- Заболевания органов зрения (неврит зрительного нерва, катаракта, диабетическая ретинопатия, воспалительные заболевания глаз);

- Подагра;
- Тромбофлебит.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Внутрь. Взрослым и детям с 13 лет. Препарат дозируется по рифампицину-10 мг/кг массы тела, но не более 5 таблеток. Препарат принимается натощак за 30-40 минут до завтрака. Общая курсовая доза от 2 до 4 месяцев в зависимости от характера туберкулезного процесса. При массе тела 80 кг дополнительно назначается изониазид в вечернее время.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Подробное описание смотреть в инструкции к препарату.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Таблетки, покрытые оболочкой. Одна таблетка содержит изониазид, 60 мг + рифампицин, 120 мг + пирразинамид, 300 мг + этамбутола гидрохлорид, 225 мг + пиридоксина гидрохлорид, 20 мг. По 50 или 100 таблеток в полимерной банке в картонной пачке вместе с инструкцией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

По рецепту.