

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТАБЛЕТОК/УПАКОВОК НА 1 ПАЦИЕНТА, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА С СОХРАНЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Препараты АО «АКРИХИН»	Состав ¹	Фасовка ¹	1 пациент при весе 60 кг			
			Количество таблеток/сутки	Кратность приема/сутки	Количество таблеток в интенсивную фазу (на 60 дней)	Количество таблеток в фазу продолжения (на 120 дней)
ИЗОКОМБ®	Рифампицин 120 мг Изониазид 60 мг Пиразинамид 300 мг Этамбутол г/х 225 мг Пиридоксин г/х 20 мг	таблетки № 50	5 таблеток	1 раз	240 таблеток (5 упаковок)	-
ФТИЗОПИРАМ®	Изониазид 150 мг Пиразинамид 500 мг	таблетки № 2500 (25 банок по 100 таблеток)	4 таблетки	1 раз	240 таблеток (3 банки)	480 таблеток (5 банок)
ФТИЗОПИРАМ® В6	Изониазид 150 мг Пиразинамид 500 мг Пиридоксин г/х 15 мг	таблетки № 100	4 таблетки	1 раз	240 таблеток (3 упаковки)	480 таблеток (5 упаковок)
ФТИЗОЭТАМ®	Изониазид 150 мг Этамбутол г/х 400 мг	таблетки № 2500 (25 банок по 100 таблеток)	4 таблетки	1 раз	240 таблеток (3 банки)	480 таблеток (5 банок)
ФТИЗОЭТАМ® В6	Изониазид 150 мг Этамбутол г/х 400 мг Пиридоксин г/х 15 мг	таблетки № 100	4 таблетки	1 раз	240 таблеток (3 упаковки)	480 таблеток (5 упаковок)
РИФАПЕКС	Рифапентин 150 мг	таблетки № 64	4 таблетки	2 раза в неделю	68 таблеток (1 упаковка)	136 таблеток (2 упаковки)
				3 раза в неделю	102 таблетки (2 упаковки)	204 таблетки (3 упаковки)

1. Данные взяты из инструкций к лекарственным препаратам, размещенным в Государственном реестре лекарственных средств на 28.08.2017 г.
Информация для медицинских и фармацевтических работников

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ТАБЛЕТОК/УПАКОВОК НА 1 ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Препараты АО «АКРИХИН»	Состав ¹	Фасовка ¹	1 пациент при весе 60 кг		
			Количество таблеток/сутки	Кратность приема/сутки	Профилактика, 3 месяца
ФТИЗОПИРАМ®	Изониазид 150 мг Пиразинамид 500 мг	таблетки № 2500 (25 банок по 100 таблеток)	2 таблетки ³	1 раз	180 таблеток (2 банки)
ФТИЗОПИРАМ® В6	Изониазид 150 мг Пиразинамид 500 мг Пиридоксин г/х 15 мг	таблетки № 100	2 таблетки ³	1 раз	180 таблеток (2 упаковки)
ФТИЗОЭТАМ®	Изониазид 150 мг Этамбутол г/х 400 мг	таблетки № 2500 (25 банок по 100 таблеток)	2 таблетки ³	1 раз	180 таблеток (2 банки)
ФТИЗОЭТАМ® В6	Изониазид 150 мг Этамбутол г/х 400 мг Пиридоксина г/х 15 мг	таблетки № 100	2 таблетки ³	1 раз	180 таблеток (2 упаковки)

1. Данные взяты из инструкций к лекарственным препаратам, размещенным в Государственном реестре лекарственных средств на 28.08.2017 г.

2. Кратность приема и доза по Рифапентину взяты из рекомендаций РОФ «Инструкций по химиопрофилактике туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией». В.В. Покровский, Е.В. Воронин, И.А. Васильева

3. При необходимости добавить этамбутол или пиразинамид с учетом дозы и веса больного

Информация для медицинских и фармацевтических работников