






**Разрешен детям  
старше 3-х лет**

**ВЕРНЫЙ ШАГ  
В ПРАВИЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ТУБЕРКУЛЕЗА**

# Фтизопирам® Фтизопирам® В<sub>6</sub>



-  В 2 РАЗА УМЕНЬШАЮТ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТАБЛЕТОК В СУТКИ<sup>2-4</sup>
-  РАЗРЕШЕНЫ ДЕТЯМ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ<sup>1</sup>
-  ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОПОСТАВИМА С МОНОПРЕПАРАТАМИ АНАЛОГИЧНОГО СОСТАВА<sup>5</sup>
-  ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ<sup>6,7</sup>
-  ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП

Соответствует методическим рекомендациям по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов дыхания: I и III режимам химиотерапии.<sup>6</sup>

## Информация для специалистов здравоохранения

Перед назначением препаратов ознакомьтесь с инструкциями по применению.

РЕКЛАМА

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МНН, УТВЕРЖДЕННЫЕ МЗ РФ.
2. Соколова Г.Б., Зевев А.П., Мохирева Л.В., Дубинский Р.Д. Клиническая эффективность и фармакоэкономика комбинированных противотуберкулезных препаратов // Главврач – 2005. – № 9. – С. 26-33.
3. Зевев А.П., Мохирева Л.В., Юрченко Н.И., Мишин В.Д., Стерликов С.А., Русских О.Е., Русских О.Е. Фтизоэтам В<sub>6</sub> и Фтизопирам В<sub>6</sub> при лечении впервые выявленных больных туберкулезом с выделением микобактерий // Туберкулез и болезни легких. – 2012. – № 5. – С. 44-52.
4. Мохирева Л.В., Хосева Е.Н., Мохирев А.В., Джиря П.И., Морозова Т.Е. Фармакоэпидемиологическое исследование воспроизведенных комбинированных противотуберкулезных препаратов и приверженности к ним врачей-фтизиатров в широкой клинической практике // Биомедицина – 2011. – № 3. – С. 141-148.
5. ПЕРЛЬМАН М.И. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА // ФТИЗИАТРИЯ. НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО/под редакцией М.И. Перльмана – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007 – С. 512.
6. Приказ № 951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».
7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ. Под редакцией И.А. Васильевой, В.В. Покровского, Е.Е. Ворониной – 2016

АО «Акрихин» 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, улица Кирова, дом 29, тел.: +7 (495) 702 95 06.



**Торговое наименование:**  
**ФТИЗОПИРАМ® В6**

**Регистрационный номер:**  
**ЛС-002336**  
**от 10.05.2017г.**

**МНН:**  
**Изониазид + Пиразинамид + Пиридоксин**

### **СОСТАВ:**

1 таблетка содержит активного вещества: изониазид – 150 мг, пиразинамид – 500 мг, пиридоксин гидрохлорид – 15 мг.

### **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:**

Противотуберкулезное средство комбинированное  
Код АТХ: J04AC51

### **ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Лечение и профилактика всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду и пиразинамиду *M.tuberculosis*, в составе комбинированной терапии. Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов..

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Повышенная чувствительность к изониазиду, пиразинамиду, пиридоксину или любому другому компоненту препарата; лекарственный гепатит и/или другие тяжелые побочные реакции, развившиеся на фоне предшествующего лечения изониазидом; заболевания печени в стадии обострения; печеночная недостаточность тяжелой степени тяжести; цирроз печени; эпилепсия, эпилептический синдром, бронхиальная астма, псориаз, хроническая почечная недостаточность, подагра, гиперурикемия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет.

### **С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:**

Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести, нарушения функции печени в анамнезе или хронические нарушения функции печени, судорожные припадки, возраст старше 35 лет, длительный прием других потенциально гепатотоксических

лекарственных средств, отмена терапии изониазидом в анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция, декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в анамнезе, «медленные ацетиляторы», женский пол.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:**

**Взрослые. Лечение:** Препарат принимают внутрь, после еды, запивая большим количеством воды, один раз в сутки.

Расчет дозы препарата производят по изониазиду. Взрослые: суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) пациентам с массой тела 33-50 кг - 300 мг, пациентам с массой тела 51-70 кг - 300-600 мг, пациентам с массой тела более 70 кг - 600 мг. Максимальная суточная доза 600 мг. Дети старше 3 лет: суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) - 7 - 15 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза 600 мг. Дозы и длительность лечения препаратом устанавливаются индивидуально в зависимости от характера и тяжести заболевания, эффективности лечения и переносимости. Дозы и длительность приема препарата должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.

**Профилактика:** Внутрь, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза 600 мг.

Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Подробное описание смотреть в инструкции к препарату

### **ФОРМА ВЫПУСКА:**

Таблетки.  
По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена). Каждая банка вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА:**

По рецепту.



**Торговое наименование:**  
**ФТИЗОПИРАМ®**

**Регистрационный номер:**  
**PN0033731/01**  
**от 15.08.2017г.**

**МНН:**  
**Изониазид + Пиразинамид + Пиридоксин**

### **СОСТАВ:**

1 таблетка содержит активного вещества: изониазид – 150 мг, пиразинамид – 500 мг.

### **ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:**

Противотуберкулезное средство комбинированное  
Код АТХ: J04AC51

### **ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

Лечение и профилактика всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду, пиразинамиду *M.tuberculosis*, в составе комбинированной терапии.

Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Повышенная чувствительность к изониазиду, пиразинамиду или любому другому компоненту препарата; лекарственный гепатит и/или другие тяжелые побочные реакции, развившиеся на фоне предшествующего лечения изониазидом; гиперурикемия, подагра, заболевания печени в стадии обострения; печеночная недостаточность тяжелой степени тяжести; цирроз печени; эпилепсия, эпилептический синдром, бронхиальная астма, псориаз, хроническая почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; микседема, беременность, период грудного вскармливания.

### **С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:**

Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести, нарушения функции печени в анамнезе или хронические нарушения функции печени, почечная недостаточность, судорожные припадки, возраст старше 35 лет, длительный прием других потенциально гепатотоксических лекарственных средств, отмена тера-

пии изониазидом в анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция, декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в анамнезе, «медленные ацетиляторы», женский пол.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:**

Внутрь, запивая большим количеством воды, 1 раз в сутки. Препарат следует принимать натощак (по крайней мере, за 0,5 часа до еды или через 2 часа после).

Дозы и длительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от характера и тяжести заболевания. Дозирование проводится по изониазиду.

### **Лечение**

**Взрослые:** суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) пациентам с массой тела 33-50 кг – 300 мг, пациентам с массой тела 51-70 кг – 300-600 мг, пациентам с массой тела более 70 кг – 600 мг. Максимальная суточная доза 600 мг.

**Дети старше 3 лет:** суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) 7-15 мг/кг. Максимальная суточная доза у детей с массой тела до 50 кг - 450 мг, у детей с массой тела более 50 кг следует применять дозировки для взрослых.

### **Профилактика**

Внутрь, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза 600 мг.

Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:**

Подробное описание смотреть в инструкции к препарату

### **ФОРМА ВЫПУСКА:**

По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена). 25 банок с инструкцией по применению в коробке из картона.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА:**

По рецепту.